

UWAGA

W związku z wystąpieniem na terenie kraju zachorowań na ptasią grypę informujemy:

Objawy ptasiej grypy u zwierząt

Okres inkubacji trwa 3 do 5 dni w zależności od szczepu wirusa (czasami do 7 dni), gatunku drobiu i jego wieku.

Objawy kliniczne ptasiej grypy u drobiu są mało charakterystyczne i zróżnicowane w zależności od zjadliwości szczepu wirusa wywołującego chorobę, gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących oraz warunków środowiskowych.

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:

depresja;
brak apetytu;
gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj;
objawy nerwowe;
zasinienie i obrzęk grzebienia i korali;
silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie;
trudności z oddychaniem;
biegunka;

Padnięcia mogą być nagłe, bez widocznych objawów sygnalizujących zakażenie. Śmiertelność może dochodzić do 100%. Przy zakażeniu wirusem grypy o niskiej zjadliwości mogą wystąpić objawy (raczej łagodne) ze strony układu oddechowego, depresja, biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek aż do zaniku, osłabienie, stroszenie piór i gorączkę. Zakażone ptaki wydają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych. Przedłużająca się choroba powoduje wzrastające przekrwienie, głównie na gardle, tchawicy, żołądka i tłuszczu w okolicy serca oraz podskórne obrzmienie na głowie i nogach zwierząt.

Tekst udostępniany z wikipedii na licencji GNU Free Documentation License.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. **Nie zbliżać się do dzikiego ptactwa**, w tym również na wszelki wypadek miejskich gołębi (choć jak dotąd uważa się, że gołębie nie są atakowane przez H5N1).
2. **Nie zbliżać się bez ważnej potrzeby do ferm drobiu** oraz miejsc sprzedaży żywych ptaków.
3. **Unikać kontaktu z powierzchniami i przedmiotami**, które miały bezpośredni kontakt z ptakami, np. klatki, samochody do przewożenia ptactwa, przedmioty zanieczyszczone fekaliami ptaków.
4. **Nie jeść surowych jaj ani niedogotowanego drobiu**. Po wykryciu przypadków ptasiej grypy wśród drobiu hodowlanego dojdzie jeszcze jedna rada: mięso dotykamy przez jednorazowe gumowe rękawiczki, przedmioty stykające się z nim myjemy dokładnie detergentem (wystarczy zwykły płyn do mycia naczyń).
5. Po wykryciu ognisk choroby w fermach hodowlanych **zapominamy o koglu-moglu i jajkach na miękko**.
6. Naukowcy twierdzą, że w profilaktyce może mieć znaczenie **szczepienie przeciw zwykłej grypie**. Osoba zaszczepiona prawdopodobnie ma szansę na dużo łagodniejszy przebieg choroby. Niestety, u wielu osób reakcja układu odpornościowego na szczepionkę przypomina słabszą odmianę grypy, włącznie z gorączką i koniecznością kilkudniowego leczenia. Takie osoby powinny skonsultować się przed szczepieniem z lekarzem prowadzącym.